

Comment amorcer votre traitement avec ENDOMETRIN^{MD}

Qu'est-ce que ENDOMETRIN^{MD}?

Le comprimé vaginal effervescent ENDOMETRIN^{MD} est un supplément de progestérone pour les femmes qui se soumettent à un traitement de fécondation in vitro (FIV).

Comment ENDOMETRIN^{MD} agit-il?





La progestérone est l'une des hormones essentielles pour devenir enceinte et rester dans cet état.

Comment dois-je utiliser ENDOMETRIN^{MD}?

Dosing :

Vous devez insérer un comprimé à l'intérieur de votre vagin 2 à 3 fois par jour.

Administration :

-  **1** Déballe l'applicateur.
-  **2** Placez un comprimé dans l'espace prévu à l'extrémité de l'applicateur. Le comprimé doit bien s'ajuster et ne pas tomber.
-  **3** Alors que vous vous trouvez en position debout, assise ou couchée sur le dos, les genoux pliés, placez délicatement l'extrémité mince de l'applicateur profondément à l'intérieur de votre vagin.
-  **4** Poussez sur le piston pour libérer le comprimé.
- 5** Retirez l'applicateur et jetez-le à la poubelle.

N'oubliez pas d'utiliser ENDOMETRIN^{MD} exactement selon les directives de votre médecin.

Que faire si j'oublie une dose?

Si vous omettez une dose d'ENDOMETRIN^{MD}, prenez-la dès que vous constatez votre oubli, mais n'excédez pas votre dose quotidienne.

Si vous avez des questions ou des inquiétudes, n'hésitez pas à communiquer avec nous.

Nom de la clinique : _____

Nom du médecin : _____


Adresse : _____

Ville : _____

Province/Territoire : _____

Code postal : _____

Numéro de téléphone : (____) _____



Notes :

Renseignements importants sur l'innocuité :

Les stéroïdes sexuels peuvent également augmenter le risque de trouble visuel. Consultez votre médecin si vous êtes âgée de 35 ans ou plus et si vous fumez pour prévenir les complications. Vous devez cesser de prendre ENDOMETRIN^{MD} et communiquer immédiatement avec votre médecin si vous subissez des maux de tête intenses, des troubles visuels ou un accident vasculaire cérébral.

L'arrêt subit de la prise d'ENDOMETRIN^{MD} peut provoquer de l'anxiété, de la morosité et une augmentation du risque de convulsions. Si la dépression s'accroît, on doit cesser de prendre ENDOMETRIN^{MD}.

Parmi les effets secondaires fréquemment rencontrés lors de l'utilisation d'ENDOMETRIN^{MD}, on retrouve : douleurs abdominales, nausée, augmentation du volume des ovaires (syndrome d'hyperstimulation ovarienne), ballonnement abdominal, maux de tête, crampes utérines, saignements vaginaux, vomissements, infections urinaires, constipation et fatigue. Cette liste d'effets secondaires n'est pas exhaustive. Si vous subissez un effet inattendu lors de la prise d'ENDOMETRIN^{MD}, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le dépliant d'information sur le médicament destiné à la patiente qui vous a été remis avec votre ordonnance d'ENDOMETRIN^{MD}.

Référence :
ENDOMETRIN^{MD} Monographie de produit. Ferring Produits Pharmaceutiques. 11 mai 2015.

© 2017 Ferring Inc. Tous droits réservés.
ENDOMETRIN^{MD} est une marque de commerce déposée de Ferring B.V.

